

Международный научно-практический журнал

ЕВРАЗИЙСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

2020, том 8, № 2 Приложение

Eurasian Journal of Oncology
International scientific journal

2020, volume 8, number 2 Supplement

Тезисы XI Съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии

**23–25 апреля 2020 г.
Казань, Россия**

**Впервые
в режиме онлайн**



Бронзовая композиция с часами, посвященная известному татарскому поэту Габдулле Тукаю.
Установлена в Казани на улице Баумана в 1999 году.

ISSN 2309-7485 (Print)
ISSN 2414-2360 (Online)

ПИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИЗДАНИЯ

Сравнительная характеристика традиционного и современных методов скрининга рака шейки матки

Нишанов Д.А., Мадалиев А.А., Ишмуратов Ф.Е., Хамидов С.Ю.
Республиканский специализированный Научно-практический Медицинский Центр
Онкологии и Радиологии, Ташкент, Узбекистан

Цель. Дать характеристику и показать достоинства жидкостной цитологии перед традиционным методом скрининга рака шейки матки.

Материалы и методы. В настоящее время в скрининге рака шейки матки применяют два метода: традиционный PAP-тест и жидкостную цитологию. Не смотря на то, что оба метода сохраняют свою значимость в клинико-диагностических лабораториях, жидкостная цитология является более новым и обладает рядом преимуществ.

Результаты. Традиционный метод:

- Ручной метод – наличие человеческого фактора;
- Потеря до 80% клеток;
- Слипание и наложение клеток;
- Материал загрязнен неклеточными биологическими элементами (слизь, кровь и пр.);
- Высокая вероятность ложноотрицательного результата;

Жидкостная цитология:

- Автоматизация процесса – отсутствие человеческого фактора;
- 100% клеток доступно для изучения;
- Равномерное распределение клеток;
- Минимальное содержание ненужного биоматериала;
- Минимальная вероятность ложноотрицательного результата;
- Возможность обнаружения клеток, пораженных вирусом папилломы человека (ВПЧ);

С применением в нашей лаборатории системы жидкостной цитологии "Huro Path" (CelltraZone), мы добились почти 100%-ной постановки диагноза рака шейки матки и снижения количества ложноотрицательных результатов на 40-60%, установление степени дисплазии эпителия (CIN I, CIN II, CIN III) стало легче.

Выводы. На основании вышеизложенных данных можно заключить, что метод жидкостной цитологии позволяет получить более достоверные результаты и должен стать основным методом скрининга рака шейки матки.

Анализ результатов ультразвукового исследования у пациенток, страдающих раком эндометрия I стадии

Овчарова Е.О.
РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова, Минск,
Республика Беларусь

Введение. Тактика лечения пациенток, страдающих раком эндометрия (РЭ) I стадии зависит от глубины инвазии опухоли в миометрий. Точное определение этого параметра позволяет не применять избыточное воздействие у пациенток с глубиной инвазии менее ? толщины миометрия и исключить риск недостаточного лечения при глубине инвазии более ? толщины миометрия.