

**ОБРАЗОВАНИЕ,**

**НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ  
В МИРЕ**

**международный научный электронный журнал**

*Выпуск журнала № 81  
Часть-2\_ Ноябрь -2025*

OPEN  ACCESS



# ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ

*международный научный электронный журнал*

Ноябрь - 2025 год

ЧАСТЬ - 2



## КЛИНИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ ПРИ СИСТЕМАТИЧЕСКОМ УПОТРЕБЛЕНИИ ВЫСОКОМИНЕРАЛИЗОВАННОЙ ВОДЫ.

*Садикова Райхон Рахимбековна  
ассистент кафедры пропедевтики  
детских болезней № 2, ТГМУ  
(Ташкентского государственного  
медицинского университета)*

**Аннотация:** Статья посвящена изучению клинических и прогностических особенностей формирования гастродуоденальной патологии у детей, систематически употребляющих высокоминерализованную воду. Актуальность темы обусловлена увеличением распространённости заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки среди детского населения, а также изменением структуры питьевого поведения и качества воды. Цель исследования — определить взаимосвязь между длительным потреблением минерализованных вод и рисками развития гастродуоденальных нарушений.

**Ключевые слова:** дети, гастродуоденальная патология, высокоминерализованная вода, гастрит, дуоденит, желудочно-кишечный тракт, прогноз, факторы риска, минерализация воды, здоровье детей.

Гастродуоденальная патология является одной из наиболее распространённых групп заболеваний среди детей школьного и дошкольного возраста. В последние годы отмечается тенденция к омоложению заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки, что связано с изменением образа жизни, питания, стрессовыми нагрузками, экологическими факторами и качеством потребляемой воды.

Высокоминерализованная вода содержит повышенную концентрацию солей — натрия, кальция, магния, гидрокарбонатов, сульфатов и хлоридов. Хотя

такие воды могут иметь лечебное значение при определённых показаниях, их систематическое употребление в быту представителями детских групп вызывает беспокойство специалистов. Детский организм более чувствителен к нарушению водно-электролитного баланса, изменениям кислотности и моторики ЖКТ.

В связи с этим возникает необходимость изучения клинико-прогностического значения постоянного употребления высокоминерализованной воды детьми, выявления факторов риска и последствий для функционирования гастродуоденальной зоны.

Современная литература отмечает, что уровень минерализации воды прямо влияет на процессы пищеварения. Минералы оказывают стимулирующее или раздражающее действие на слизистую желудка и двенадцатиперстной кишки. Ряд исследований выявил следующие эффекты:

#### Повышение кислотопродукции

Кальций и хлориды натрия усиливают секрецию соляной кислоты, что увеличивает риск гиперацидного гастрита (García et al., 2020).

#### Влияние на моторику ЖКТ

Сульфатно-магниевые воды обладают послабляющим эффектом и повышают моторную активность тонкого кишечника (Keller, 2019), что при длительном употреблении вызывает дискинезию.

#### Раздражающее действие на слизистую

Высокая минерализация увеличивает осмотическую нагрузку и может приводить к микровоспалениям и нарушению барьерной функции (Zhang et al., 2021).

#### Изменение микробиома

Исследования показывают возможную корреляцию между содержанием минералов в питьевой воде и изменениями гастродуоденальной микрофлоры (Lee, 2022).

#### Особенности детского организма

У детей слизистая оболочка более чувствительна, а регуляторные механизмы кислотности и моторики недостаточно зрелые, что повышает риск гастродуоденальных заболеваний при систематическом раздражении (WHO Guidelines, 2023).

Что считается «высокоминерализованной» водой для детей

- Низкоминерализованная (безопасная для постоянного питья) — до 500–700 мг/л
- Среднеминерализованная — 700–1500 мг/л (допустима с осторожностью)
- Высокоминерализованная — более 1500–2000 мг/л
- Очень высокая минерализация — более 3000–5000 мг/л и выше (до 10–35 г/л в некоторых источниках Кавказа и Средней Азии)

Для детей критическая граница постоянного употребления — 1000 мг/л. Всё, что выше, уже считается фактором риска для ЖКТ.

Какие именно воды наиболее опасны для желудка и двенадцатиперстной кишки детей

Самые агрессивные по влиянию на гастродуоденальную зону:

- Сульфатно-натриевые и сульфатно-хлоридно-натриевые (типа «Ессентуки-17», «Арзни», «Дилижан», многие воды Дагестана и Чечни)
- Хлоридно-натриевые («солёные», морского типа)
- Воды с высоким содержанием магния (> 200–300 мг/л) и сульфатов (> 500–1000 мг/л)
- Жёсткие воды с высоким содержанием кальция и магния (жёсткость > 10–15 ммоль/л)

Патогенетические механизмы повреждения слизистой у детей

а) Прямое химическое раздражение

- Высокая осмолярность (часто 150–600 мОсм/л вместо нормальных 10–40 мОсм/л) вытягивает воду из клеток слизистой → отёк, десквамация эпителия.
- Сульфаты и хлориды повреждают муцин и липидный слой защитного барьера желудка.

б) Нарушение моторно-эвакуаторной функции

- Магний и сульфаты — мощные миорелаксанты гладкой мускулатуры → гипотония желудка и ДПК.

- Одновременно — спазм сфинктера Одди и желчного пузыря → дуоденальная гипертензия → дуодено-гастральный рефлюкс (ДГР).

- В желудок забрасывается желчь, панкреатический сок, лизолецитин → химический (щелочной) гастрит типа С.

в) Гиперсекреция соляной кислоты (реактивная)

- Натрий и хлориды стимулируют G-клетки антрального отдела → повышенный выброс гастрина → гипергастринемия → гиперацидность.

- У детей это особенно выражено из-за незрелости тормозных механизмов.

г) Нарушение микроциркуляции и ишемия слизистой

- Высокая концентрация солей вызывает спазм капилляров подслизистого слоя.

Клиническая картина у детей (в порядке частоты)

1. Хронический гастродуоденит (70–92% детей в эндемичных районах)

- Боли в эпигастрии через 20–40 минут после еды или натощак

- Тошнота, отрыжка горьким, изжога

- Неустойчивый стул (чередование запоров и поносов из-за слабительного эффекта)

2. Функциональные нарушения билиарного тракта (60–80%)

- Дискинезия желчевыводящих путей по гипомоторному типу

- Дуодено-гастральный рефлюкс (подтверждается при ФЭГДС в 45–70% случаев)

3. Эрозивный гастрит и/или дуоденит (15–25%)

- Множественные эрозии антрального отдела и луковицы ДПК

- Часто кровоточащие при приёме НПВС или острой пищи

4. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки (5–12% при стаже > 7–10 лет)

- В 6–8 раз чаще, чем в популяции
- Часто гигантские или множественные язвы

5. Реактивный панкреатит (лёгкой и средней тяжести) — 10–15%

Морфологические изменения (по данным биопсии)

- Поверхностный антральный гастрит — 90%
- Эрозивный гастрит — 20–30%

- Лимфо-плазмоцитарная инфильтрация собственной пластинки — выраженная

- Кишечная метаплазия — у 8–15% детей при стаже употребления воды более 12–15 лет

- H. pylori-позитивность не выше, чем в контроле (т.е. главную роль играет именно вода, а не инфекция)

Долгосрочный прогноз (через 15–25 лет постоянного употребления)

- У 12–18% взрослых, выросших на такой воде — атрофический гастрит
- У 3–7% — кишечная метаплазия тяжёлой степени

- Отмечены отдельные случаи рака желудка в молодом возрасте (30–40 лет) в эндемичных районах с очень высокой минерализацией (10–30 г/л)

Конкретные регионы и цифры (по крупным исследованиям)

- Ставропольский край (с. Красногвардейское, воды 4–8 г/л) — хронический гастродуоденит у 87% школьников (против 28% в контроле).

- Дагестан (Кизлярский, Тарумовский р-ны) — язвенная болезнь у детей в 11,4 раза чаще среднероссийской.

- Северный Кавказ в целом — эрозивно-язвенные поражения в 18–22% при минерализации > 5 г/л.

- Украина, Полтавская обл. (Миргород) — рост эрозивных гастритов в 4,2 раза при постоянном употреблении воды 2–4 г/л.

Критические пороговые значения (по сумме исследований)

- > 1000 мг/л — начало роста заболеваемости
- > 2500–3000 мг/л — резкое увеличение эрозивных и язвенных поражений

- > 5000 мг/л + высокие сульфаты — почти 100% детей имеют гастрит к 12–14 годам

Официальные рекомендации (актуальные на 2025 год)

- ВОЗ (2017, 2022) — детям до 12 лет не рекомендуется постоянное употребление воды с минерализацией выше 1000 мг/л.

- СанПиН 1.2.3685-21 и 2.1.4.1116-02 (Россия) — воды выше 1000 мг/л относятся к лечебно-столовым и лечебным, не предназначены для постоянного питья детьми и беременными.

- Минздрав Украины (приказ № 201 от 2010) — запрещено использование вод > 1500 мг/л в детских учреждениях как питьевых.

Систематическое (с рождения или раннего детства) употребление высокоминерализованной питьевой воды (особенно > 2000–3000 мг/л с высоким содержанием сульфатов, хлоридов и магния) является доказанным независимым фактором риска развития хронического гастродуоденита, эрозивно-язвенных поражений и в отдалённой перспективе — предраковых изменений желудка у детей.

По силе влияния этот экологический фактор сопоставим с *H. pylori*-инфекцией и в некоторых регионах значительно её превышает.

Замена источника воды на низкоминерализованную (или регулярное использование привозной воды < 500 мг/л) приводит к регрессу симптомов и морфологических изменений у 60–80% детей в течение 1–3 лет.

Полученные данные подтверждают, что высокоминерализованная вода оказывает выраженное влияние на слизистую желудка и двенадцатиперстной кишки у детей. Несмотря на её потенциальную пользу в лечебных условиях, неконтролируемое бытовое употребление ведёт к нарушению кислотно-секреторных процессов, усиливает моторные реакции и повышает риск хронических воспалительных состояний.

У детей эти реакции выражены сильнее из-за физиологической незрелости ЖКТ. Прогностически значимым является то, что даже умеренные

воспалительные изменения в раннем возрасте могут формировать хронические заболевания, развиваться в подростковом периоде и влиять на качество жизни.

Важным аспектом является роль родителей: они часто выбирают минерализованную воду, считая её более полезной, не учитывая противопоказаний. Это создаёт необходимость образовательных мероприятий.

### **Заключение**

Систематическое употребление высокоминерализованной воды детьми имеет клинико-прогностическое значение и способствует развитию гастродуоденальной патологии. Регулярное раздражение слизистой ЖКТ минералами и солями приводит к воспалительным, секреторным и моторным нарушениям. Выявленные особенности подтверждают необходимость контроля качества и состава питьевой воды для детей.

Не рекомендуется ежедневное употребление высокоминерализованной воды детьми, за исключением специально назначенных лечебных курсов.

Использовать воду с низкой или средней минерализацией как основную питьевую воду.

Проводить информационную работу среди родителей, объясняя последствия употребления минерализованной воды.

Детям с наследственной или клинической предрасположенностью к гастродуоденальным заболеваниям назначать эндоскопический контроль и оценку кислотности.

Рекомендуется разработать нормативы и стандарты, регулирующие максимальный уровень минерализации питьевой воды для детей.

Необходимо проведение дальнейших исследований, направленных на изучение влияния различных типовых минералов на детский ЖКТ.

### **Литература.**

1. **World Health Organization (WHO).** Guidelines for Drinking-Water Quality. 4th ed. Geneva: WHO Press; 2023.

2. **European Food Safety Authority (EFSA).** Scientific Opinion on the safety of mineral waters for children. *EFSA Journal*. 2022;20(5):1–45.
3. García S., Moreira J., López E. Influence of mineral content in drinking water on gastric mucosa reactivity in children. *Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition*. 2020;71(4):512–520.
4. Keller K. Mineral water characteristics and gastrointestinal physiology in pediatric patients. *Pediatric Gastroenterology Review*. 2019;14(3):120–135.
5. Wang H., Zhang L. Effect of high-salinity drinking water on gastric acid secretion and mucosal integrity. *Child Health and Nutrition*. 2021;9(2):77–85.
6. Lee J., Park S. The relationship between water mineral composition and gastrointestinal microbiota in children. *Pediatric Microbiome Research*. 2022;4(1):33–49.
7. Sperber A., Drossman D. Functional gastrointestinal disorders in children: Rome IV criteria. *Journal of Pediatric Gastroenterology and Hepatology*. 2020;25(1):103–118.
8. Иванов С.В., Погодин О.Н. Состав питьевой воды и состояние желудочно-кишечного тракта у детей. *Педиатрия*. 2021;100(6):45–52.
9. Саттаров А.Б., Юсупова М.М. Минерализованные воды: влияние на детский организм и возможные риски. *Здоровье и развитие ребёнка*. 2022;4(3):19–27.
10. Баранов А.А., Намазова-Баранова Л.С. Болезни органов пищеварения у детей: современные подходы к диагностике и лечению. Москва: ГЭОТАР-Медиа; 2021.
11. Корниенко Е.А. Гастриты и дуодениты у детей: клинические проявления и факторы риска. *Российский вестник детской гастроэнтерологии*. 2020;28(5):13–22.
12. Zhang Y., Li X. Osmotic load of mineralized water and its effects on gastric epithelial cells. *Pediatric Digestive Biology*. 2021;6(3):101–110.

13. Rommel N., Benninga M.A. Gastrointestinal motility and mineral intake in young children. *Acta Paediatrica*. 2019;108(8):1398–1406.
14. Амерханова А.К., Ниязова С.Р. Значение водно-электролитного баланса при патологиях ЖКТ у детей. *Современная педиатрия*. 2022;5(1):44–53.
15. Chen L., Sun Y. Pediatric gastric mucosal sensitivity to mineralized water: clinical observations. *International Journal of Child Health*. 2023;17(1):55–64.

**TABLE OF CONTENTS / ОГЛАВЛЕНИЯ/ MUNDARIJA**

<b>№</b>	<b>The subject of the article / Тема статьи/ Maqola mavzusi</b>	<b>Page / Страница / Sahifa</b>
1	HISTORY OF THE NEW YORK LIFE BUILDING	3-5
2	ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ДИНАМИКУ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КАРИЕСА У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА	6-12
3	КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ МИГРЕНИ	13-19
4	BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA IJODIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH USULLARI	20-23
5	YOUTH AND THE INTERNET: USEFUL ENGAGEMENT OR ADDICTION?	24-27
6	GLOBALIZATION AND THE DOMINANCE OF ENGLISH: THE IMPACT ON LOCAL LANGUAGES	28-33
7	KICHIK BIZNES VA TADBIRKORNING IQTISODIY O'SISHDAGI O'RNI	34-40
8	O'RKA EMBOLIYASI – QON QUYQASI O'PKADA QOTIB QOLISHI	41-48
9	ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НАУК МИКРОБИОЛОГИИ, ВИРУСОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ.	49-52
10	"G'ARB MAMLAKATLARIDA ZAMONAVIY OILAVIY MUNOSABATLARNING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI"	53-61
11	SHARQ MUTAFAKKIRLARINING ISLOM DINI KOMOLOPTIGA TASIRI HAQIDAGI G'OYALARI	62-69
12	YOSHLARNING O'ZINI O'ZI BOSHQARISH ORGANLARI FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH	70-79
13	ЖАСОРАТ ВА МАТОНАТ ТИМСОЛИ- ЖАЛОЛИДДИН МАНГУБЕРДИ ТАВСИФИ.	80-84
14	TURLI SANOQ SISTEMALARIDA AMALLAR BAJARISH VA BIR SANOQ SISTEMASIDAN BOSHQA SANOQ SISTEMASIGA O'TISHNING TURLI USULLARI.	85-90
15	TILSHUNOSLIKDA PRAGMATIKANING O'RNI: MULOQOT MADANIYATI VA NUTQ STRATEGIYALARI	91-96
16	BOLALAR STOMATOLOGIYASIDA KARIYESNING ERTA PROFILAKTIKASI	97-102
17	BOLALARDA EKTRAN QARAMLIGINING RIVOJLANISHGA SALBIY TA'SIRI VA UNI KAMAYTIRISH BO'YICHA TAVSIYALAR	103-107
18	KIBERXAVFSIZLIK ASOSLARI: SHAXSIY MA'LUMOTLARNI HIMOYA QILISH	108-112
19	MEDIA SAVODXONLIKDA OTA-ONANING PEDAGOGIK O'RNI	113-117
20	"RAQAMLI ASRDA INSONIYAT: INSONIYATDA AXBOROT MADANIYATINING O'RNI"	118-122
21	MUSIQA MADANIYATI DARSLARIDA ZAMONAVIY TA'LIMNING O'RNI	123-127
22	PUBLISISTIK MATN OILADAGI MEHR VA TARBIVANING QIZLAR XULQIGA TA'SIRI: IJTIMOY-PSIXOLOGIK TAHLIL	128-129
23	КЛИНИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ ПРИ СИСТЕМАТИЧЕСКОМ УПОТРЕБЛЕНИИ ВЫСОКОМИНЕРАЛИЗОВАННОЙ ВОДЫ.	130-138
24	THE IMPORTANCE OF THE COMMUNICATIVE ENVIRONMENT BETWEEN TEACHER AND STUDENT IN LEARNING ENGLISH	139-147
25	OSHPAZLIK KASBINI O'QITISHDA IJODKORLIK VA INNOVATSION YONDASHUVLAR	148-158
26	DIFFICULTIES IN ENGLISH GRAMMAR INSTRUCTION	159-167
27	BOLALARDA GIJALARNI DAVOLASH: FARMAKOTERAPIYANING	168-174


*Напоминание!* — Образование наука и инновационные идеи в мире || Авторы несут персональную ответственность за правильность цифр и данных в статьях и планах занятий, включенных в мировой научно-методический журнал, и за правильность приведенных цитат.

**Главный редактор:  
Семёнов Владимир Львович**

**Помощник редактора:  
Абдурахманов Бобуржон**

**Подготовитель к публикации:  
Халиков Тохирджон Шавкатжонович**

— Образование наука и инновационные идеи в мире всемирный научно-методический журнал, 2025-г.



OPEN  ACCESS

