



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН



МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИЙ РУЗ



ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС СТОМАТОЛОГОВ

**«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТОМАТОЛОГИИ
И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ»**



СБОРНИК ТЕЗИСОВ

was completely closed, and the axis of the displaced tooth was parallel to the axis of the supporting tooth, indicating that the tooth was repositioned. Conclusion Orthodontic treatment with piezocorticotomy and skeletal support is an effective method that allows mesialization of mandibular molars in place of missing teeth and reduces treatment time.

References:

1. Kayaa D., Tanerb T.U. Management of an Adult with Spased Dentition, «Class III Malocclusion and Open-bite Tendency». Eur J Dent. Jan. 2011, 5(1): 121-129.
2. Yelampalli at all Rachala. «Timely management of developing class III malocclusion». J Indian Soc Pedod Prev Dent. 2012. Jan-Mar; 30(1): 78-84.

ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА ИЗМЕНЕНИЙ ВНЧС ПРИ ОТКРЫТОМ ПРИКУСЕ

Аралов М.Б., Нигматова И.М., Зикирова М.Б.

Ташкентский государственный стоматологический институт

Актуальность. В настоящее время заболевания ВНЧС являются актуальной проблемой современной стоматологии. К. Ott выявил негативное воздействие открытого прикуса на деятельность височно-нижнечелюстного сустава.

Цель: изучить взаимосвязь осложнений открытого прикуса с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава. Ранняя диагностика и профилактика дисфункции височно-нижнечелюстного сустава.

Материалы и методы. Для исследования мы провели анализ среди школьников 145-школы города Ташкент. Из 115 школьников 60 имели аномалии в прикусе. А из 60 школьников 6 учеников имели открытый прикус. А после проведенного анализа и сделанного опроса обнаружилось, что у 5 из них отмечались дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. При мышечно-суставной дисфункции ВНЧС возникли болевые ощущения в области жевательных мышцах, чувство усталости во время жевания, нарушение тонуса жевательных мышц, а также тугоподвижность нижней челюсти (Каламкаров Х. А., 1994; Хватова В. А., 1996; Трезубов В. Н., 1997; Щербаков А. С. , 1999; Хватов И. А., 2001; Лакшина Т. А., 2001; Соколовых Е. А., 2003; Онопа Е. А., 2003; Ронкин К., 2012 и др.).

Нами проведена ранняя диагностика аномалий открытого прикуса и выявлены способы профилактики дисфункции ВНЧС.

Вывод: Открытый прикус, как и другие патологические прикусы влияет на функциональность ВНЧС. 60 учеников из 115 (52,17%) имели патологию в прикусе. Открытый прикус отмечался у 6 (10%) из них, который сопровождался с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава. Своевременная диагностика и профилактика помогут избежать осложнений, а также может быстро и безболезненно вылечить эту патологию.

Литература

1. Нигматов, Р., Нигматова, И., Кадыров, Ж., & Холмирзаев, Р. (2020). ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К КОРРЕКЦИИ РЕЧИ ДЕТЕЙ С ОТКРЫТЫМ ПРИКУСОМ. Stomatologiya, 1(2(79), 59–63. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/stomatologiya/article/view/1163>
2. Нигматов, Р., Нигматова, И., Акбаров, К., & Раззаков, У. (2019). КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ТРАНСВЕРСАЛЬНЫХ АНОМАЛИЯХ. Stomatologiya, 1(4(77), 70–75. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/stomatologiya/article/view/1499>
3. Нигматов, Р., Нигматова, И., Акбаров, К., & Раззаков, У. (2019). КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ТРАНСВЕРСАЛЬНЫХ АНОМАЛИЯХ. Stomatologiya, 1(4(77), 70–75. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/stomatologiya/article/view/1499>

ORTHODONTIC TREATMENT OF PATIENTS WITH CLEFT LIP AND PALATE, TAKING INTO ACCOUNT STRUCTURAL FEATURES AND TONGUE DYSFUNCTION

Muinov Sattor

Resident of the clinical residency of 1 year of study of the Department of Orthopedic Dentistry of the Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Cleft lip and palate is the most common malformation of the maxillofacial region. According to clinical and ultrasonographic examination, patients with RGN have pathological pressure of the tip of the tongue on the mandibular alveolar region and lack of physiological effect on the anterior maxillary process, which, along with the pathological effect of the scar of the lip and palate, contributes to the aggravation of the deformation of the alveolar curve. We studied 40 patients with VRN aged 2-13 years (32 boys (80%) and 8 girls (20%)), who, depending on the age of the patient,

<i>TYPES OF FACE IN YOUNG PATIENTS WITH DISTAL OCCLUSION OF TEETH</i>	
<i>Khaydarov Ulugbek</i>	286
<i>COMPLICATIONS OF MEDIAL FACIAL COVID19 IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS</i>	
<i>Khaydarov Ulugbek</i>	287
<i>CURRENT STATE AND PROBLEMS OF COMPUTER DIAGNOSTICS OF CHILDREN WITH SECONDARY DEFORMITIES OF TEETH</i>	
<i>Jalolov Sharifjon</i>	289
<i>SELECTION OF AN EFFECTIVE STERILIZATION REGIME FOR NEW OSTEOPLASTIC MATERIALS</i>	
<i>Jalolov Sharifjon</i>	290
<i>EFFECTS OF STATIC AND DYNAMIC ETCHING ON THE SURFACE OF HYBRID CERAMICS.</i>	
<i>Rahmonberdiyeva Rushana</i>	291
<i>DIGITAL METHODS FOR ANALYZING THE WORK OF THE CHEWING SYSTEM</i>	
<i>Rahmonberdiyeva Rushana</i>	293
<i>SPECTRAL PROPERTIES OF ADHESIVE CEMENTS FOR BONDING CERAMIC RESTORATIONS</i>	
<i>Narziyeva Nigora</i>	294
<i>CLINICAL AND EXPERIMENTAL DATA FOR THE SELECTION OF NON-REMOVABLE ORTHOPEDIC STRUCTURES WITH DENTAL IMPLANTS CONTAINING CANTILEVER ELEMENTS</i>	
<i>Narziyeva Nigora</i>	295
<i>THE IMPACT OF DENTAL ALLOY TREATMENT ON CORROSION RESISTANCE</i>	
<i>Karayev Shakhboz</i>	297
<i>COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE</i>	
<i>Karayev Shakhboz</i>	298
<i>ORTHODONTIC AND SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH MISSING OR DEFORMED TEETH.</i>	
<i>Sattarov Yusufboy</i>	300
<i>COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE</i>	
<i>Sattarov Yusufboy</i>	301
<i>ORTHODONTIC AND SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH MISSING OR DEFORMED TEETH</i>	
<i>Muinov Sattor</i>	302
<i>ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА ИЗМЕНЕНИЙ ВНЧС ПРИ ОТКРЫТОМ ПРИКУСЕ</i>	
<i>Аралов М.Б., Нигматова И.М., Зикирова М.Б.</i>	304