

ISSN 1727-5725

Національний медичний університет
імені О. О. Богомольця

Українська асоціація лікарів-
дерматовенерологів і косметологів

№ 3 (38)
2010

УЖДВК

УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ДЕРМАТОЛОГІЇ ВЕНЕРОЛОГІЇ КОСМЕТОЛОГІЇ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ВИДАННЯ

Головний редактор В. Г. Коляденко

ЗАСНОВАНИЙ У ЛЮТОМУ 2004 РОКУ

ВІДВІДНО ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ» / 2010 р.



Преподобний
Арапіт Печерський.
Найдавніший лікар
Києво-Печерської лаври



Стуковенков Михайло Іванович
(1842—1897),
перший завідувач кафедри
дерматології та венерології
медичного факультету ім. В. Г. Короленка
в Києві

Ukrainian Journal of
Dermatology, Venereology,
Cosmetology
Scientific and practical journal

WWW.UJDVC.COM.UA
WWW.VITAPOL.COM.UA

— С. Джалилов, Т.П. Рахматов, Б.А. Исабаев, З.М. Сулакадзе
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр
дерматологии и венерологии, Республика Узбекистан, Ташкент

Использование «Глутоксима» в терапии ладонно-подошвенной кератодермии

Важное место среди наследственных заболеваний кожи занимают ладонно-подошвенная кератодермия, которые характеризуются нарушением процессов ороговения. Как и большинство дерматальных кератиноцитов, ретикулируется за счет клеточной пролиферации и аплоптоза, приводящих к структурному ремоделированию. В патогенезе заболевания ведущую роль играет наследственно обусловленное нарушение процессов клеточного обновления, что приводит к гиперпролиферации кератиноцитов с последующим нарушением их дифференцировки на фоне снижения апоптотической активности клеток эпидермиса.

Схожесть клинической картины с такой при других заболеваниях, которые сопровождаются поражением ладоней и подошв, вызывает определенные трудности в диагностике дерматоза. Диагностика кератодермии основывается на особенностях клиники и симптомах сопутствующих заболеваний.

Большой интерес представляет использование в патогенетической терапии препарата «Глутоксим». Это представитель нового класса лекарственных препаратов — тиопуртинов. «Глутоксим» является синтетическим аналогом природного гепептида — окисленного глутатиона (GSSG) и проявляет присущие GSSG биохимические свойства. Он обладает иммуномодулирующим и цитопротекторными свойствами, оказывая дифференцированное воздействие на нормальные (стимуляция пролиферации и дифференцировки) и трансформированные (индукция апоптоза) клетки.

Целью нашего исследования была оценка целесообразности включения «Глутоксима» в комплексную терапию ладонно-подошвенной кератодермии.

Лечение проводили 20 больным с различными формами кератодермии. Препарат применяли внутримышечно в суточной дозе 10 мг в течение 20 дней. В результате лечения у всех больных наблюдали уменьшение субъективных ощущений, шелушения в очагах поражения и уплощение элементов.

По результатам анализа иммунограмм (до и после лечения) основную группу больных разделили на подгруппы, так, наблюдался достаточно большой разброс данных по каждому из показателей, поэтому статистически эти результаты были недостоверны. У одних больных уровень CD4⁺ был изначально снижен и после проведенного лечения «Глутоксимом» повысился, в другой подгруппе — нормализовался, однако это не сказалось на характере течения заболевания и, по-видимому, было обусловлено генетическими особенностями пациентов.

Результаты сравнения эффективности лечения ладонно-подошвенной кератодермии препаратом «Глутоксим» в комплексе с базовой терапией и применения только базовой терапии свидетельствуют о потенцирующем влиянии «Глутоксима» на эффективность базовой терапии.

Таким образом, препарат «Глутоксим» совместим с основной терапией, повышает ее эффективность, что проявляется улучшением качества жизни пациентов, сокращением сроков лечения, уменьшением площади высыпаний, более быстрой регрессией симптомов. Фармакологическая активность препарата «Глутоксим» обусловлена его способностью устранять дисбаланс регуляторного воздействия цитокинов на иммуноциты и кератиноциты, что проявляется нормализацией иммунологических показателей.

Д.С. Джалилов, Б.А. Исабаев, Т.П. Рахматов, М.Р. Махсудов
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр
дерматологии и венерологии, Республика Узбекистан, Ташкент

Значение эндогенной интоксикации у больных ладонно-подошвенной кератодермией

Одним из наследственных заболеваний кожи является ладонно-подошвенная кератодермия (ЛПК). Это группа дерматозов характеризуется нарушением процессов ороговения — избыточным рогообразованием преимущественно ладоней и подошв, что связано с нарушением защитно-барьерной функции кожи, что приводит к увеличению концентрации в дермисе и эпидермисе токсических про-

дуктов обмена, что в свою очередь оказывает отрицательное влияние на клиническое течение и результаты лечения заболевания.

Известно, что при различных патологиях в организме происходит нарушение ряда биохимических процессов. Накопление недоокисленных продуктов обмена, различных токсических веществ экзо- и эндогенного происхождения может приводить к