

17-18 маусым 2023 / June 17-18, 2023 / 17-18 июня 2023

Алматы / Almaty



Республикалық форумы / Republican forum / Республиканский форум

**«Оториноларингологияның өзекті мәселелері»
«Актуальные вопросы оториноларингологии»
“Topical questions of otorhinolaryngology”**



бірлесіп / and / совместно с

**CASOS — 2023 2-ші Халықаралық конгресімен
2nd International congress CASOS — 2023
2-м Международным конгрессом CASOS — 2023**

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

congresskaz2023.com

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БАЛЛОНОПЛАСТИКИ СЛУХОВОЙ ТРУБЫ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ СРЕДНИМ ОТИТОМ

Эргашев У.М.¹, Тожибаев З.Н.²

¹Ташкентская Медицинская академия, г. Ташкент, Узбекистан

²Частная клиника «Jizzax LOR shifo», г. Джизак, Узбекистан

Введение

На сегодняшний день хронические отиты являются одним из распространённых патологий [1,2]. Одним из основных этиологических факторов хронических средних отитов является дисфункция слуховой трубы, которая существенно влияет на результат восстановительных операций среднего уха [1, 5]. Оценка функции слуховой трубы является неотъемлемой частью обследования пациентов с патологией уха, в т. ч. и дооперационном этапе, так как эта является одним из основных прогностических факторов слухулучшающих операций. Ранние и отдалённые результаты тимпаноластики зависят от состояния функции слуховой трубы, что является ориентиром для выбора оптимального метода оперативного вмешательства [3,4,5]. Однако отдельно взятые методы не всегда достаточно эффективны.

Мы поставили перед собой цель определить эффективность тимпаноластики с комбинацией субаннулярных Т-образных трубок для длительной вентиляции среднего уха и баллонную тубопластику при стойких дисфункциях слуховой трубы. Нами было взято под наблюдение 48 больных, из 19 пациентам поставлена субаннулярная трубка для длительной вентиляции, 13 пациентам сделано баллонная тубопластика и 16 пациентам проведено комбинация субаннулярной трубки и баллонной тубопластики для устранения отрицательного влияния слуховой трубы на результаты тимпаноластики в период 2019-2021 гг. Все больные были с перфорацией на барабанной перепонке и 2-ой, 3- степенями дисфункции слуховой трубы.

В качестве предоперационной оценки функции слуховой трубы применяли шкалу опросника дисфункции евстахиевой трубы (ETDQ-7), модифицированный ин-

фляционно-дефляционный тест (ETF2). После операционном периоде к выше перечисленным дополнительно проводили ETF1 тест (опыт Уильямса).

Анализ результатов показал, что тимпаноластика в комбинации трубок для длительной вентиляции в сочетании баллонной тубопластикой даёт больше эффективности чем отдельно взятые.

Список литературы

1. Leichtle A, Hoffmann TK, Wigand MC. Otitis media – Definition, Pathogenese, Klinik, Diagnose und Therapie [Otitis media: definition, pathogenesis, clinical presentation, diagnosis and therapy]. *Laryngorhinootologie*. 2018 Jul;97(7):497-508. German. doi: 10.1055/s-0044-101327. Epub 2018 Jul 9. Erratum in: *Laryngorhinootologie*. 2018 Jul;97(7):E2. PMID: 29986368.
2. Lin A.C., Messner A.H. Pediatric tympanoplasty: Factors affecting success. *Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg*. 2008;16(1):64–68. doi: 10.1097/MOO.0b013e3282f43430
3. Bellucci R.J. Selection of cases and classification of tympanoplasty. *Otolaryngologic Clinics of North America*. 1989;22(5):911–926. Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2694069>.
4. Vartiainen E., Nuutinen J. Success and pitfalls in myringoplasty: Follow-up study of 404 cases. *Am J Otol*. 1993;14(3):301–315. Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8372930>.
5. Eremeeva K.V., Varosyan E.G., Sobolevskaya A.O., Lunicheva A.A., Sobolev V.P. Methods of preoperative assessment of function of the auditory tube in patients with chronic tubotympanal purulent otitis media. *Meditinskiy sovet = Medical Council*. 2020;(6):140–147. (In Russ.) doi: 10.21518/2079-701X-2020-6-140-147