



Sog'liqni saqlash
vazirligi



Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi



Andijon davlat
tibbiyot instituti

TIBBIYOTNING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION YONDASHUV



RESPUBLIKA YOSH OLIMLAR
ILMIY-AMALIY ANJUMANI

MATERIALLARI

2023

28-Aprel

ANDIJON



TIBBIYOTNING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION YONDASHUV 2023

**RESPUBLIKA YOSH OLIMLAR
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI**

MATERIALLARI

28-APREL, 2023-YIL

TIBBIYOTNING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION YONDASHUV 2023

**RESPUBLIKA YOSH OLIMLAR
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI**

TAHRIRIYAT JAMOASI

BOSH MUHARRIR

M.M.Madazimov

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARLARI

K.Z.Saloxiddinov, J.A.Johongirov, Sh.Y.Bustanov

TAHRIRIYAT HAY'ATI A'ZOLARI

B.R.Abdullajonov, G.N.Mamatxujayeva, Z.S.Saloxiddinov,
X.T.Musashayxov, D.B.Asrankulova, M.E.Abdullayeva,
L.S.Xudoyberdiyeva, M.R.Mamajonova, N.Sh.Buranova,
M.M.Kuzibayeva, N.A.Mamatova

KOMPYUTER GRAFIK MUHARRIRLARI

Y.S.Gromov, S.X.Abduraxmonov

**ANDIJON
28-APREL, 2023-YIL**

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЕ БРОНХООБСТРУКТИВНОГО
СИНДРОМА У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА

Нормаматов Д.Х., соискатель

Научный руководитель: Файзиева У.Р., д.м.н., доцент
Термезский филиал Ташкентской медицинской академии

Актуальность проблемы. Широкое распространение бронхо-обструктивного синдрома (БОС) у детей определяет важность своевременного выявления значимых дифференциально-диагностических признаков, а также установления зависимости между факторами риска и особенностями течения бронхиальной обструкции у детей грудного возраста. Болезни органов дыхания в настоящее время занимают одно из лидирующих мест в структуре детской заболеваемости и остаются актуальной проблемой педиатрии. Одним из наиболее распространенных поражений нижних дыхательных путей являются бронхиты, которые развиваются у 50 % детей.

Цель исследования: выделить наиболее значимые предикторы для различных вариантов БОС у детей грудного возраста на основе изучения анамнестических данных, особенностей клинической картины и факторов риска для оптимизации диагностики и прогноза заболевания.

Материалы и методы: В исследование были включены 100 детей с БОС в возрасте от 3 месяца до 4 лет. Набор пациентов производился на базе областной детской многопрофильном медицинском центре г. Термеза, в отделение пульмонологии. Больные дети распределяли на две группы: в первую группу (n=60) вошли дети с БОС неаллергического генеза; во вторую (n=40) - дети с БОС аллергического генеза. У всех детей проводили анализ анамнестических данных и особенностей клинической картины, а также оценку факторов риска. Статистический анализ выполняли с использованием программного для Windows "Statistica 6.0".

Результаты и их обсуждение. Первый этап исследования включал в себя сравнительную характеристику БОС у детей грудного возраста по началу развития и длительности течения, анализ частоты встречаемости клинико-анамнестических параметров и особенностей терапии БОС, а также оценку факторов риска в двух сравниваемых группах. Анализ частоты встречаемости бронхиальной обструкции разной длительности показал, что продолжительность БОС от 3 до 5 дней статистически значимо чаще отмечалась у детей с БОС неаллергического генеза (68,6%), чем в группах «БОС аллергического генеза» (31,4%); при сравнении с обеими группами $p < 0,05$. Среди факторов риска для детей из группы БОС аллергического генеза статистически значимыми оказались: аллергический диатез, крапивница и отек Квинке в анамнезе — отмечены у 8,4% детей (ОШ=8,31; 95%, ДИ: 2,180–31,42); аллергические заболевания у родственников — отмечены у 7,5% детей (ОШ=5,912; 95%, ДИ: 1,389–24,258); Клинико-анамнестический анализ позволил доказать неоднородность БОС у детей грудного возраста и возможность выделения различных его вариантов. Выявление детей с признаками атопической патологии и отягощенным аллергическим анамнезом необходимо для раннего прогнозирования развития рецидивирующего БОС и формирования групп риска по развитию БА.

Заключение. Выделение значимых параметров среди клинико-анамнестических данных анализов может применяться у детей для дифференциальной диагностики БОС. Это позволит применять дифференцированный подход при ранней диагностики, лечении, диспансеризации и определении прогноза у детей, перенесших БОС в грудном возрасте.

**О ЧАСТОТЕ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ОСЛОЖНЕНИЙ САХАРНОГО ДИАБЕТА У ЛИЦ
НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ**

Амина А.Н.

3 курс 331 группы лечебного факультета СамГМУ

Актуальность. Распространение сахарного диабета составляет серьёзную медико-социальную проблему сегодняшнего дня. По данным ВОЗ уже к 2025 году количество больных с таким диагнозом превысит 300 млн. Особой опасностью сахарного диабета является высокий риск развития осложнений в случае неполной компенсации заболевания. Осложнения ведут к ухудшению качества жизни и уменьшению её средней продолжительности.

Цель исследования: Анализ распространенности осложнений сахарного диабета у лиц имеющих ХСН.

Материал и методы. Использованы данные о диагностике и лечении 26 больных, поступивших в отделение кардиологии 1-клиники Самаркандского Государственного Медицинского Университета в период с июня по август 2022 года.

Результаты и обсуждение. Для анализа были взяты 26 больных, страдающих хронической сердечной недостаточностью, осложненной сахарным диабетом. Они составили 19% от общего количества больных с диагнозом ХСН. Все больные имели 2ой тип, т.е. инсулиннезависимый сахарный диабет. Из них в качестве основного заболевания были диагностированы всего 4 (15%) случая СД, в качестве сопутствующего 12 (46%) случаев СД и в качестве конкурирующего заболевания 10 (39%) случаев СД.

Самым распространенным осложнением СД 2го типа на фоне ХСН стала диабетическая сенсорная полинейропатия. Это состояние, при котором поражается периферическая нервная система в результате гликирования структурных белков нервных волокон. Это осложнение встречалось у 7 больных и составило 27% от общего количества. Также у 5 больных (19%) была выявлена диабетическая ангиопатия, которая связана с повышенной концентрацией глюкозы в крови. Из единичных осложнений у трех пациентов с СД 2го типа выявлены нефропатия и ретинопатия, у одного парадонтоз и один случай диабетической энтеропатии. Встречаемость осложнений составила 20 случаев (77%) из всего числа больных с СД 2го, поступивших в отделение.

При этом 8 больных из данной группы имели 2ую группу инвалидности и 1 больной имел 1ую группу инвалидности, что также свидетельствует о тяжести течения СД 2го типа.

Выводы. Несмотря на развитие медицины в сфере борьбы с эндокринными заболеваниями и пропагандой здорового образа жизни, число больных с сахарным диабетом увеличивается ежегодно. Большее количество из них со временем приобретает тяжелые формы осложнений, в результате чего нормальный ритм их жизни в корне меняется, качество её ухудшается. Все больные нуждаются в грамотной тактике лечения для предотвращения подобных случаев.

**ЛЕЧЕНИЕ ТРАВМАТИЧЕСКОГО МЕСТНОГО ОТЕКА И ЛИМФАТИЧЕСКОГО
СТАЗА ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ**

**Нуриддинов Б., Абдухалимов О., Меликузизода Ш.,
магистры 2-го года обучения по специальности «Травматология и ортопедия»**

**Научный руководитель: д.м.н., доцент Давлатов Б.Н.
кафедра «Травматологии, ортопедии и нейрохирургии» АГМИ**

Актуальность. Травматические повреждения опорно-двигательного аппарата (ОДА) характеризуются сложностью лечения и высоким процентом инвалидности, летальность при