



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН
ФЕРГАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ
КАФЕДРА НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ**

***РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ***

**«ПСИХИАТРИЯ И ПСИХОСОМАТИКА В ХХІ ВЕКЕ»
(05 июня 2024 г.)**



Фергана

СБОРНИК КОНФЕРЕНЦИИ

*Редакционная коллегия республиканской научно
практической конференции Ферганского медицинского
института общественного здоровья*

*Главный редактор Сидиков А.А. - д.м.н., профессор, ректор
ФМИОЗ*

*Зам.глав редактора Болтабоев У.А. - проректор по учебной
работе, PhD*

*Кадирова М.Р. - проректор по научной работе
и инновациям, д.м.н., профессор*

*Редколлегия Мурадинова А.Р. – заведующая кафедрой
«Неврологии и психиатрии», PhD*

*Махмутов Р.Х. – ассистент кафедры
«Неврологии и психиатрии», ответственный
кафедры по науке*

*Редактор компьютерной
Графики Валитов Э.А – Руководитель центра
информационных технологий*

Tadqiqot maqsadi: Tadqiqotning maqsadi ambulatoriya bosqichida mehnatga layoqatli yoshdagi odamlarda serebrovaskulyar kasalliklarning neyropsixologik xususiyatlarini o'rganish.

Tadqiqot materiallari va usullari: 90 nafar mehnatga layoqatli yoshdagi shaxslar so'rovdan o'tkazildi. Klinik nevrologik va klinik instrumental tekshiruvlardan o'tkazildi.

Natijalar va munozaralar: Birinchi guruh arterial gipertenziya fonida dyscirculatory ensefalopatiya bilan og'rigan bemorlardan iborat - 60 kishi, ikkinchisi miya yarim aterosklerozi fonida dyscirculatory ensefalopatiya bilan - 30. Kognitiv funktsiyani baholash Statuscale Mental MMSE yordamida tekshirildi. DASS-21 xavotir va depressiya shkalasidan foydalanildi.

Xulosa: Tadqiqot natijalariga ko'ra, arterial gipertenziasiz dyscirculatory ensefalopatiya bilan og'rigan bemorlarda MMSE shkalasi bo'yicha sezilarli xotira buzilishi ($p < 0,003$) aniqlandi. Gipertenziya fonida dyscirculatory ensefalopatiya bilan og'rigan bemorlarda xavotir ($p < 0,001$) va depressiv buzilishlar ($p = 0,033$) arterial gipertenziasiz dyscirculatory ensefalopatiya bilan og'rigan bemorlarga nisbatan sezilarli darajada ko'proq tarqalgan. Arterial gipertenziya fonida dyscirculatory ensefalopatiya bilan og'rigan bemorlarda depressiv buzilishlar va tashvishlarning kuchayishi orientatsiya va xotirani pasaytiradi.

GENERALIZATSIYALASHGAN EPILEPSIYANING NEYROPSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Fayziyeva R. H., Azizova R. B.

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi, (Toshkent, O'zbekiston)

Tadqiqot maqsadi: Generalizatsiyalashgan epilepsiyada yuzaga keladigan neyropsixologik buzilishlarni neyropsixologik testlar yordamida tekshirib baholash.

Tadqiqot material va usullari: Tadqiqot o'tkazishimiz uchun 18 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan (o'rtacha yoshi 36.78) 70 ta bemor tanlab olindi. Ularni 3 guruhga bo'lib o'rgandik. 1-guruhga ideopatik generalizatsiyalashgan epilepsiyasi bo'lgan 16 ta bemor (ulardan 7 tasi ayol (43.75%), 9 tasi erkak (56,25%)), 2-guruhga simptomatik generalizatsiyalashgan epilepsiyasi bo'lgan 24 ta bemor (ulardan 11 tasi ayol (45.83%), 13 tasi erkak (54.16%)), 3-guruhga esa kriptogen generalizatsiyalashgan epilepsiyasi bo'lgan 30 ta bemor (ulardan 15 tasi ayol (50%), 15 tasi erkak (50%)) tashkil qiladi. Bemorlarni kognitiv faoliyatni tekshirishda MMSE shkalasidan, xavotirli-depressiv buzilishlarni aniqlashda SUNG shkalasidan foydalandik.

Tadqiqot natijalari: MMSE shkalasi bo'yicha 1-guruhdagi bemorlarning 25% da, 2-guruhdan 33.3% da, 3-guruhdan 26.6% da kognitiv buzilishlarning sezilarli kuzatilmasligi aniqlandi. 1-guruhdagi bemorlarning 50% da, 2-guruhdan 66.6% da, 3-

guruhdan 40% da yengil demensiya borligi kuzatildi. 1-guruhdagi bemorlarning 12.5% da, 3-guruhdan 33.3% da o'rta darajadagi demensiya aniqlandi. SUNG shkalasi bo'yicha tekshiruvda 1-guruhdagi bemorlarning 6.25% da, 2-guruhdan 8.33% da, 3-guruhdan 6.66% da depressiyaga moyillik aniqlandi. 1-guruhdagi bemorlarning 50% da, 2-guruhdan 50% da, 3-guruhdan 43.3% da yengil darajadagi depressiya kuzatildi. 1-guruhdagi bemorlarning 43.75% da, 2-guruhdan 41.6% da, 3-guruhdan 50% da o'rta darajadagi depressiya holati aniqlandi.

Xulosa: Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, generalizatsiyalashgan epilepsiyada kognitiv buzilishlar va depressiyaning muntazam ravishda kuzatilib turishi aniqlandi. Jumladan, ideopatik va simptomatik generalizatsiyalashgan epilepsiyada xotira pasayishining yaqqol namoyon bo'lishi, kuzatilayotgan guruhlarining barchasida esa yaqqol namoyon bo'lgan depressiya kuzatildi. Epilepsiya diagnostikasida EEG, MRT, biokimyoviy tahlillar bilan birgalikda neyropsixologik testlarni kompleks ravishda qo'llash kasallikka to'g'ri tashxis qo'yish hamda davolash samaradorligini yanada o'ttiradi.

МИКРОЦЕФАЛИЯНИНГ КЛИНИК ГЕНЕТИК-АСПЕКТЛАРИ, ТАШХИСЛАШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Холматов М. Ф.

Фарғона Жамоат Саломатлиги Тиббиёт Институти, (Фарғона, Ўзбекистон)

9. Мақсад. Микроцефалиянинг клиник генетик-аспектлари, ташхислашни такомиллаштиришдан иборат.

5. Материал ва текширув усуллари. Тадқиқотнинг объекти сифатида Фарғона вилояти РИО ва БСИАТМ скрининг бўлимида турли генезга эга микроцефалия билан келган 3 ойдан 7 ёшгача бўлган 25 нафар бемор болалар киритилган. Илмий тадқиқот ишида лаборатор, клиник-инструментал, генеалогик, цитогенетик ҳамда ХМА (хромосом микроматрик анализ) усуллардан фойдаланилди.

Натижалар. Ушбу гуруҳ 11 нафар қиз ҳамда 14 нафар ўғил беморлар. Улардан 18 нафари туғма микроцефалия, 5 нафари постнатал микроцефалия, 2 нафари тана ва бош соҳаси пропорционал микроцефалия. Беморларда МРТ текширви ўтказилганида 64% да бошмия яримшарлари барча соҳасида субатрофия аниқланди 24% беморда қадоқсимон тана гипоплазия ёки аплазияси аниқланди.

36 % да генерациялашган талваса синдроми ҳамда 8% да фокал типдаги талваса синдроми аниқланди ва 56% да талваса хуружлари аниқланмади. 76% да тана вазнини орқада қолиши, 24 % да вазни ёшига мос. 12% да қариндош никоҳида бўлган беморлар, 96 % да ақлий, нутқий ва ҳаракат ривожланишдан

17	М.Л. Аграновский, А.Б. Рахматов, Р.Х. Махмутов МЕТОДИКА АВС И НЕВРОТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ПСОРИАЗА
18	Мурадимова А.Р. ТРУДНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ: НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
19	В.К.Абдуллаева, К.Х.Каримов, Ш.И.Парпиев АНАЛИЗ ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫХ ДЕЯНИЙ У ПСИХИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД С 2021 ГОДА ПО 2023 ГОД
20	Рахматжонова Р.Р., Ирмухамедов Т.Б. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОЙ СЕМЕЙНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ ПРИ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ
21	Турсунова З.А. ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРФУНКЦИЕЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
25	Umarova M. P., Ashiraliyev I. I. PSYCHOSOMATIC SYNDROMES AND DIAGNOSTIC CRITERIA FOR PSYCHOSOMATIC RESEARCH (DCPR)
26	Umarova M. P. DISSIRKULYATSION ENSEFALOPATIYASI BO'LGAN MEHNATGA LAYOQATLI YOSHDAGI ODAMLARDA KOGNITIV BUZILISHLAR
26	Fayziyeva R. H., Azizova R. B. GENERALIZATSIYALASHGAN EPILEPSIYANING NEYROPSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI
27	Содержание